

Cocana®

MOČILO

Vsebuje:

Maščobne kisline, iz rastlinskih olj, kalijeve soli (15-20%); Maščobne kisline, koko, kalijeve soli (5-10%); Kalijev karbonat (1-5%); Etanol (1-5%)

Cocana® se uporablja kot močilo za izboljšanje pokritosti rastlin in učinkovitosti sredstev za varstvo rastlin ter kot antipenilo škroplilnih brozg na vinski trti, sadju, zelenjavi, poljščinah in okrasnih rastlinah.



Pozor: Povzroča hudo draženje oči. Hraniti zunaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Vsebina: **25 L**

Serijski in datum proizvodnje sta odtisnjena na embalaži.

Ravnanje in skladiščenje: Normalni ukrepi za preventivno požarno varnost. Poskrbeti za lokalno odsesavanje (ventilacijo), kjer je možnost vdihavanja hlapov in aerosolov. Ne izlivati v kanalizacijo, površinske vode in tla. Takoj po uporabi embalažo tesno zapreti. Nositi osebno varovalno opremo; glej poglavje 8. Skrbeti za osebno higieno (umivanje rok pred odmorom in ob koncu dela). Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Odstraniti onesnažena oblačila in jih očistiti pred ponovno uporabo. Ne vdihavati hlapov/meglence. Skladiščiti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Hraniti v tesno zaprtih posodah. Hraniti ločeno od kislin. Hraniti ločeno od močnih oksidantov. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti le v originalni embalaži. Odprte posode po uporabi dobro zapreti in postaviti pokončno za preprečevanje iztekanja/razsutja. Ne shranjati v neoznačeni embalaži. Za informacije o identificirani uporabi glejte pododdelek 1.2.

Rok uporabe: 3 leta pri predpisanem skladiščenju.

Dobavitelj: BIOFA GmbH, D-72525 Münsingen

Prodaja: Metrob d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubčana

Zaradi varovanja ljudi in okolja upoštevajte navodila za uporabo.

Navodilo za uporabo

Način delovanja: Cocana® zmanjšuje površinsko napetost pršilne tekočine in zagotavlja optimalno omočenje listov. Zmogljivost fitofarmacevtskega sredstva ali sredstva za krepitev rastlin se bistveno izboljša, s čimer se poveča biološka učinkovitost ukrepov za zaščito rastlin. Zlasti v vinogradništvu je priporočljivo dodajanje močila čistim žvepljenim pripravkom.

Uporaba in odmerki:

- 0,2 – 0,5 % konc. (2 – 5 L na 1.000 lit vode) kot dodatek drugim sredstvom.

Biofa Cocana uporabljamo po možnosti z mehko vodo. Z vodo se dobro meša v vseh razmerjih. Za nanašanje uporabljamo običajne škroplilne in pršilne naprave. Pri aplikaciji moramo biti pozorni na dobro in enakomerno omočenje plodov (zadostna količina uporabljene vode). Škropljenje izvajamo zjutraj ali zvečer.

Opozorila: Zaradi pospeševanja redčenja nastavka ne uporabljati v času cvetenja. V suši lahko povzroča porjavenje kože plodov.

Mešanje: Biofa Cocana se ne meša s pripravki MycoSin, bakrenimi sredstvi, sredstvi na osnovi *Bacillus thuringiensis* ter *Granulosevirus* (Madex), NeemAzal T/S ter listnimi gnojili v obliki soli.

Stransko učinkovanje in vpliv na koristne žuželke: v primerjavi z netretiranimi plodovi ni znanih merljivih razlik v okusu ali skladiščni sposobnosti plodov (gniloba, kalo). Za enkrat ni znanih škodljivih stranskih učinkov za žuželke (koristne in predatorske) in okolje.

Karenca: Karence ni.

Ravnanje z ostanki sredstva in prazno embalažo:

Ostanke sredstva oddati pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov. Odstranjevanje v skladu z Uredbo o odpadkih. Embalažo popolnoma izprazniti. Embalažo očistiti z vodo. Popolnoma izpraznjeno embalažo oddati pooblaščenemu podjetju za ravnanje z odpadno embalažo. Odstranjevati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadno embalažo.

Klavzula o jamstvu:

Ker na uporabo sredstva in dejavnike okolja (npr. vreme) nimamo vpliva, prevzemamo zgolj odgovornost za kakovost proizvoda.