

REBELL® amarillo

Vabe (pasti) za nadzor in zatiranje češnjeve muhe (*Ragoletis cerasi*) in drugih sadnih muh, ter velikega in malega repičnega kljunotaja (*Ceutorrhyncus napi*, *C. quadriens*).

Sestava:

Polystyrol obarvan z barvo brez kadmija in obdan z lepilom za žuželke TANGLE-TRAP, BAG T Nr. 37276 nestrupen.

Navodila za uporabo:

ZMANJŠEVANJE POPULACIJE ČEŠNJEVE MUHE NA HIŠNIH VRTOVIH

Pasti se obesijo po končanem cvetenju v drugi polovici meseca maja. Na vsako drevo odvisno od velikosti obesimo od 2 - 5 pasti. Pasti obesimo od vrha do spodnjega dela krošnje na zahodni, južni in vzhodni strani. Pri manjšem nastavku plodov potrebujemo večje število pasti.

UČINKOVITOST PASTI BO ZADOVOLJIVA ČE:

- Izobesimo dovolj pasti
- Je termin uporabe pravilen (začetek leta muhe)
- Populacija češnjeve muhe ni preobsežna in ni prevelikega naleta iz sosednjih netretiranih ali nezaščitenih nasadov in dreves
- So vse češnje spravljene ob pravem času
- Uporabljamo kontrolo redno vsako leto

NADZOR IN NAPOVEDOVANJE ŠKODLJIVOSTI ČEŠNJEVE MUHE

V zaprtih nasadih srednjih do poznih sort obesimo 1 Rebell vabo na južno stran vsakega desetega drevesa v višini obraza. V manj homogenih nasadih (visoka debla), pa moramo obesiti vabo na vsako peto drevo.

KAJ MORAMO STORITI!? Predvsem moramo biti pozorni na spremembo barve češnje pri srednje poznih sortah. Takrat je tudi zadnji termin za uporabo zaščitnih sredstev – 3 tedne pred obiranjem češenj. V tem obdobju pregledamo vse pasti in izračunamo povprečno število ujetih muh na posamezni pasti. Rezultate primerjamo z rezultati iz tabele. Če so dobljene vrednosti manjše ali enake kontrolnim, škropljenje ni potrebno, če so vrednosti prekoračene pa moramo izvesti škropljenje proti češnjevi muhi. Postopek pri poznih sortah je identičen, le da ga izvedemo približno 10 dni kasneje.

PRAG ŠKODLJIVOSTI ZA ČEŠNJEVO MUHO:

(maksimalno še dopustno število češnjevih muh na posamezni pasti, 3 tedne pred obiranjem)

sorta	pridelek		
	visok	srednji	nizek
Srednje pozne	2	1	0
pozne	1	0,5	0

DRUGE SADNE MUHE

Vabe uporabimo v skladu z navodili lokalne službe za zaščito rastlin.

NAPOVED NAPADA OD VELIKEGA IN MALEGA REPIČNEGA KLJUNOTAJA

NAČIN UPORABE: 2 rumeni lepljivi vabi obesimo na leseno stojalo 30 - 40 cm nad tlemi, v medsebojni razdalji 30 m, 2 m od robu njive.

ČAS UPORABE: Takoj ko dnevne temperature presežejo 12 °C, od marca naprej. Škropljenje je potrebno tudi , če je bil na bližnjem polju v preteklem letu močan napad škodljivca.

TERMIN ŠKROPLJENJA : 2 - 3 po prvem ulovu hroščkov na pasti odvisno od vremenskih razmer.

NAMESTITEV VAB NA ČEŠNJEVIH DREVESIH:

1. Sestavimo obe plošči
2. Povežemo z žico
3. Za napovedovanje napada obesimo 1 past na južno stran krošnje vsakega 5 - 10 drevesa
4. Za zmanjševanje populacije češnjeve muhe brez pomoči insekticidov moramo obesiti 2 - 5 vab na posamezno drevo
5. Vabe obesimo na zahodno, južno in vzhodno stran krošnje

ČIŠČENJE IN PONOVNA UPORABA VAB

Po zaključku uporabe, vabe očistimo (Glurex forte) in pred ponovno uporabo obnovimo nanos lepila (Tangletrap).

Vsebina: 8 križnih plošč

Navodila za shranjevanje:

Hranite v suhem in temnem prostoru, izven dosega otrok in živali.

Dobavitelj: Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6, Grossdietwill, Švica.

Zastopnik: Metrob d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubčana, tel. 03 78 06 330 info@metrobsi, www.metrobsi