

## REBELL® bianco

Bele plošče za nadzor leta jabolčne grizlice (*Hoplocampa testudinea*), črne in rumene češpljeve grizlice (*Hoplocampa flava*; *Hoplocampa minuta*), ter malinovega hroščka (*Byturus tomentosus*).

### Sestava:

Polystyrol obarvan z barvo brez kadmija in obdan z lepilom za žuželke TANGLE-TRAP, BAG T Nr. 37276 nestrupen. Vabe so za večkratno uporabo.

### Navodila za uporabo:

#### Bele površine so privlačne za grizlice

Posebej privlačne so bele površine, ki ne odbijajo ultravijolične svetlobe. Bele pasti so privlačne tudi za malinovega hroščka.

#### Prepoznavanje ujetih žuželk

Na pasti se lovijo tudi druge žuželke; muhe, komarji, mušice.

Prepoznavanje grizlic je enostavno. Imajo 2 para membranastih kril in kompakten svetleč trup. V primerjavi z osami, čebelami in mravljami, na začetku zadka nimajo značilne zožitve.

#### Razlike za prepoznavanje različnih grizlic na sadnem drevju:

vrsta	Dolžina trupa (mm)	Barva telesa		Barva nog
		Hrbtne stran	Trebušna stran	
Jabolčna grizlica ( <i>Hoplocampa testudinea</i> )	7,0 – 7,3	Črna	Svetlo-rjava	Svetlo-rjava
Češpljeva grizlica ( <i>Hoplocampa flava</i> )	6,0 – 6,0	Rumeno-rjava	Rumena	Rumena
Češpljeva grizlica ( <i>Hoplocampa minuta</i> )	4,5 – 5,3	Črna	Črna	Svetlo-rjava

Malinov hrošček je ovalno podolgovat in dolg od 4 – 5 mm. V začetku letanja so hroščki svetlo-rjavi, kasneje pa so temno-rjavi do črni.

#### Nadzor leta grizlic

Plošče pritrdimo z žico na vodoravno stoječo vejo.

ČAS UPORABE: 1 teden pred cvetenjem do 1 teden po cvetenju.

NAMESTITEV: v sadovnjaku na zunanjem delu krošnje na južni strani, v višini obraza.

ŠTEVILO PASTI: vsaj 2 - 3 pasti na posamezni sorti ( 30 - 50 m narazen), do 2 - 4 pri občutljivih sortah.

KONTROLA PASTI : vsaj 1 krat tedensko.

#### Ovrednotenje ulova

Na podlagi ulova izračunamo možen napad škodljivca.

Prag tolerance ( pod katerim je napad škodljivca ekonomsko neškodljiv) je:

Jabolčna grizlica: 20 do 30 osic na past.

Češpljeva grizlica: 30 osic na past .

### Nadzor leta malinovega hroščka – postavitve in kontrola vab

Plošče pritrdimo z žico na vodoravno stoječo vejo.

ČAS UPORABE: od sredine aprila do začetka pobiranja plodov.

NAMESTITEV: po istem vzorcu: v začetku na višini 0,5 – 1 m, kasneje 1,0 – 1,5 m

ŠTEVILO PASTI: minimalno 2 pasti na posamezno sorto

KONTROLA PASTI: vsaj 1 krat tedensko

### Ovrednotenje ulova

Let lahko nadziramo z belimi vabami (pojavnost in intenziteta). Na podlagi raziskav je ugotovljena povezava med številom ujetih osebkov in stopnjo napada. Stopnja tolerantnosti v nemškem delu Švice za vsoto ujetih hroščkov (od začetka leta do začetka cvetenja) je med 5 in 10 hroščkov na posamezni pasti.

### Čiščenje in ponovna uporaba vab

Po zaključku uporabe vabe očistimo (Glurex forte) in pred ponovno uporabo obnovimo nanos lepila (Tangletrap).

Življenska doba izdelka: regenerirane po napotkih, lahko vabe uporabimo trikrat.

## **Vsebina: 8 križnih plošč**

### **Navodila za shranjevanje:**

Hranite v suhem in temnem prostoru, izven dosega otrok in živali.

**Dobavitelj:** Andermatt Biocontrol AG, Stahlermatten 6, Grossdietwill, Švica.

**Zastopnik:** Metrob d.o.o., Začret 20 a, 3202 Ljubecna, tel. 03 78 06 330 info@metrob.si, www.metrob.si