

# Crox

# foliar



## NPK



- ✓ Vrhunska tekoča zmes, Gnojilo za foliarno aplikacijo in aplikacijo preko tal
- ✓ NPK obrok ustreza potrebam rastlin
- ✓ Obogaten z ekstrakti alg in elementi v sledovih, za stimulacijo rasti

# 10-4-7+TE

## Popolno foliarno gnojilo



# CroxX foliar 10-4-7

**SESTAVLJENO TEKOČE ANORGANSKO GNOJILO Z MAKROHRANILI -**

**FKS 1 (C)(I)(b)(ii), 10-4-7 / 10-1,7-5,8**

**10 % SKUPNI DUŠIK (N)**

2,4 % nitratni dušik

7,6 % sečninski dušik

**4 % SKUPNI FOSFORJEV PENTOKSID (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) (= 1,7 % P)**

4,0 % v vodi topnega fosforjevega pentoksida (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) (= 1,7 % P)

4,0 % fosforjevega pentoksida (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>) topen v nevtralnem amonijevem citratu (= 1,7 % P)

**7 % KALIJEV OKSID (K<sub>2</sub>O) (= 5,8 % K), topen v vodi**

Nizka vsebnost kloridov

Mikrohranila so popolnoma topna v vodi

0,030 % Skupni bor (B)

0,025 % Skupni baker (Cu)\* kelatiran z EDTA

0,105 % Skupno železo (Fe)\* kelatirano z EDTA

0,032 % Skupni mangan (Mn)\* kelatiran z EDTA

0,011 % Skupni molibden (Mo)

0,070 % Skupni cink (Zn)\* kelatiran z EDTA

**Tekočina:** v raztopini / masni odstotki (w/w)

**Sestava:** borova kislina1 (št. CAS 10043-35-3), fosforna kislina1 (št. CAS 7664-38-2), kalijev hidroksid1 (št. CAS 1310-58-3), Urea1 (št. CAS 57-13-6); 1KSM 1: Snovi in zmesi neobdelanega materiala

**Navodila za uporabo in odmerki:**

**Sadno drevje:** 2 - 4 l/ha večkratno pred cvetenjem in v času razvoja plodov.

Za gnojenje se uporablja tudi med cvetenjem.

**Zelenjava:** 2 - 4 l/ha dva tedna po vzniku. Ponovite vsakih 14 - 21 dni.

**Okrasne rastline:** 2 tedna po vzniku neprekinjeno nanašajte 1-2 % raztopino za fertirigacijo.

**Površina:** 2 - 4 l/ha.

**Namakanje:** Za tretiranje zemlje/korenin uporabite 5 - 10 % raztopino.

**Upoštevajte lokalna priporočila.**

**Pogoji skladiščenja:**

V običajnih skladiščnih pogojih se lahko izdelek ohrani dolgo časa (zmerna temperatura, suho in zaščiteno pred direktno sončno svetlobo). Uporabljeni IBC ali kanistri morajo biti pravilno zapečateni, da se prepreči onesnaževanje. Izogibajte se temperaturam skladiščenja pod +5 °C in nad +40 °C, da zagotovite obstojno kakovost.

**Informacije o varnosti in okolju:**

**To gnojilo vsebuje sečnino, ki lahko sprošča amonijak in lahko vpliva na kakovost zraka.**

**Glede na lokalne razmere je potrebno sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe.**

**Izdelek je razvrščen v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]**

**H315** Povzroča draženje kože.

**H319** Povzroča hudo draženje oči.

**P264** Po uporabi izdelka se je potrebno temeljito umiti.

**P280** Nositi zaščitne rokavice / zaščitno za oči / zaščitno za obraz.

**P302+P352** PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.

**P305+P351+P338** IPRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem.


**P332+P313** Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.



**Splošne informacije:**

**SAMO ZA PROFESIONALNO  
UPORABO.**

Neto volumen:  
**20 L**  
(23,8 kg)



**Cd**  
≤ 20 mg/kg  
P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>

Proizvajala: CroxX GmbH & Co. KG  
Kerstingskamp 7  
48159 Münster / ZR Nemčija  
www.croxX-fertilizer.de



Prodaja: METROB d.o.o.  
Začet 20a, 3202 Ljubecna  
tel. 03 78 06 330  
info@metrob.si www.metrob.eu

Product n°: 5600 235 2202

Številka serije: označena na ločeni etiketi