

Sikucit

Uporablja se za odpravljanje težjih oblik bekserja, ki jih s klasičnim bakrovim sulfatom ne moremo odstraniti. Odlikuje ga hitra reakcija, dobra sedimentacija in enostavna uporaba. Namenjen odstranjevanju merkaptanov, disulfida in ostalih žveplovih spojin.

Navodila za uporabo in odmerek:

Potrebno količino sredstva med mešanjem dodamo v vino. Po 24 urah vino filtriramo, z namenom preprečitve ponovnega raztapljanja snovi, ki povzročajo vonj po žveplovodiku. Okvirni odmerek je 2 - 3 g/hl. Najvišji dovoljen odmerek je 10 g/hl.

*v primeru uporabe odmerka višjega od 3g/hl je potrebno opraviti dodatno modro bistenje

Vsebina: 10 g

Navodila za shranjevanje:

Hranite v originalni embalaži v hladnem, suhem in temnem prostoru, izven dosega otrok.

Dodatne informacije:

Pred dodajanjem v vino, naredimo predhodni test za določitev potrebnega odmerka. Po uporabi naredimo test na baker, da izključimo možnost naknadne motnosti.

Dobavitelj: ZEFÜG GmbH & Co. KG, Alfred-Nobel-Straße 9, 55411 Bingen, Nemčija.

Prodaja: METROB d.o.o., Začret 20a, 3202 Ljubčana, Slovenija; T: 03 78 06 330, E: info@metrobsi ,
www.metrobsi