

InsectoSec®

Vsebuje: 1000 g/kg silicijev dioksid (CAS 61790-53-2)

Formulacija: DP-prašivo. Vrsta proizvodov 18 – Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev). Št. dovoljenja: SI-0028083-0000 1-1.

Posipanje s pršenjem in posipanjem površin proti plazečim se insektom, kot so mravlje in ščurki ter proti rdečim perutninskim pršicam:

- za neprofesionalno uporabo
- za uporabo v zaprtih prostorih v ogradah za perutnino, industrijskih in institucionalnih območjih ter zasebnih stanovanjih

Sestava: InsectoSec® je 100 % silicijev dioksid, naravne amorfne kremenke iz fosilnih usedlin kremenčastih alg. Ob upoštevanju navodil za uporabo niso znani nobeni negativni učinki.

Način delovanja: Fini prah se lepi na telo škodljivcev, kot so rdeče ptičje pršice pri perutnini in plazeče se žuželke, kot so mravlje in ščurki, zaradi lastnega gibanja in/ali zaužitja med nanašanjem. Učinkovina vodi do sproščanja kutikularnih lipidov in do dehidracije žuželk. Škodljivci umrejo po nekaj urah. Pri nizkih temperaturah ali pri povečani vlažnosti se lahko učinek biocida InsectoSec® podaljša za 1-2 dni.

Navodila za uporabo / Področje uporabe Uporaba v suhem notranjem okolju proti:

- Nemškimi ščurki (*Blattella germanica*) • Orientalskim ščurki (*Blatta orientalis*)
- Perutninskimi rdečimi pršicami (*Dermanyssidae*) • Vrtnimi mravljam (*Lasius niger*)

Način uporabe Posipanje s pršenjem površin (rdeče perutninske pršice), razpok in špranj proti ščurkom, poti insektov (mravelj) in skrivališč, z ročnim posipalnikom (npr. posipalnikom prahu, majhnim ročnim mehkom za posipanje).

Odmerki

Redčenje (%): Koncentracija v uporabi: 100-odstotni silicijev dioksid/Kieselguhr

Interval med ponovnimi uporabami: najmanj 7 dni

- Za plazeče se insekte: 7 g/m², širina prepreke 1-3 cm ali 5 g/mravljišče.
- Za perutninske rdeče pršice: 50 g/m² za preventivno in kurativno tretiranje.

Navodila za uporabo

Insectosec® je proizvod za manj obsežno nanašanje v suhem okolju. Ugotovite skrivališča in poti insektov. Pri obdelavi insektov v bivališčih kokoši tretirajte okolje, ne nanašajte neposredno na živali. Nanašanje na mokre površine zakasni učinkovitost.

Za ščurke: Nanesite v razpoke, špranje, vdolbine ter poti, kjer bi se lahko zadrževali insekti. Po možnosti nanesite neposredno na insekte.

Za mravlje: nanesite na poti insektov, ustvarite prašne prepreke na poteh insektov in vstopnih mestih (okoli odprtih mravljišč), na krajih, kjer je prepreka zaščitena pred zunanjimi vplivi. V odprtih prostorih proizvod nanašajte samo ob suhem vremenu. Če obstaja več vstopnih mest v mravljišče, proizvod enakomerno nanesite na vsa mesta. Če mravlje ves proizvod porabijo, ponovite tretiranje po 24 urah. Ne nanesite več kot 3-krat/mravljišče. Ne nanašajte proizvoda, če je v naslednjih 24 urah pričakovan dež. Zmanjšanje prisotnosti mravelj je opazno v roku 1-3 tednov.

Za rdeče perutninske pršice: nanesite kot splošno tretiranje površine. Tretirajte tudi razpoke in špranje, vdolbine in poti ali vsa druga mesta, kjer bi se lahko zadrževale ali v katera lahko vstopijo pršice.

Uporaba proti rdečim perutninskim pršicam: ne nanašajte neposredno na perutnino.

1. Preventiva: Nanos v čisto in suho ogrado za perutnino, preden prispejo živali. Napršite zadostno količino proizvoda, da vse površine prekrijete z belim filmom (približno 50 g/m²).

2. Kurativa: Nanos v okuženo ogrado za perutnino – pri čemer so živali zunaj. Napršite zadostno količino proizvoda, da vse površine prekrijete z belim filmom (približno 50 g/m²). Po možnosti nanesite neposredno na insekte. Po potrebi ponovno nanesite po 7 dneh. Učinek zmanjšanja prisotnosti insekticidov je opazen po 1-3 tednih. Omejite uporabo plastenke za posipanje na največ 2 m dolge prepreke na dan.

Posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Za uporabo v ogradah za perutnino: Uporabljajte samo v praznih bivališčih za živali. Pred tretiranjem umaknite živila. Območje za krmljenje prekrijte s plastično prevleko. Pred uporabo prekrijte vse rezervoarje za vodo. Ne pršite neposredno na steljo.

Za uporabo v industrijskih in institucionalnih območjih ter zasebnih bivališčih: Ne uporabljajte neposredno na hrani, krmi ali pijači oziroma v njihovi bližini ali na površinah in pripomočkih, ki utegnejo biti v neposrednem stiku s hrano, krmo, pijačo in živino. Pred tretiranjem umaknite živila. Uporablja se samo na območjih, ki so nedostopna malčkom, otrokom ter hišnim in neciljnim živalim;vProizvod ali odpadke je treba odstraniti z mokrim čiščenjem. Med tretiranjem in odstranjevanjem proizvoda sesanje ni dovoljeno. Po uporabi si umijte roke. Upoštevajte navodila za uporabo na etiketi.

Opis ukrepov prve pomoči:

V primeru izpostavljenosti: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. **PRI STIKU S KOŽO:** Umiti kožo z veliko vode. Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. **PRI VDIHAVANJU:** Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. **PRI ZAUŽITJU:** Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. **PRI STIKU Z OČMI:** Če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih nosite in lahko to zlahka storite. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Nujni ukrepi za zaščito okolja Če se pojavi puščanje, ga zavezite. Odpravite puščanje, če to lahko storite brez tveganja. Preprečite vstop v drenažne sisteme. Preprečite vstop v površinske vode in pronicanje v tla.

Zaščita uporabnika Preprečiti je treba nepotrebni stik s proizvodom, nepravilna uporaba je lahko škodljiva za zdravje.

Odstranjevanje

Za proizvod Odlaganje v kanalizacijo ni priporočljivo. Upoštevajte lokalne in nacionalne uradne predpise.

Za kontaminirano embalažo Upoštevajte lokalne in nacionalne uradne predpise. Vsebnik povsem izpraznite. Nekontaminirano embalažo se lahko reciklira.

Ostale informacije:



POZOR

Lahko škoduje organom (pljuča) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. Ne vdihavati prahu. Ne vdihavati razpršila. Ob slabem počutju poiščite zdravniško

oskrbo. Odstraniti vsebino do v skladu z nacionalno zakonodajo. Odstraniti posodo do v skladu z nacionalno zakonodajo.

Rok uporabe Proizvod InsectoSec® je pri skladiščenju na suhem zaprt v originalni embalaži, primeren za uporabo 2 leti od datuma proizvodnje.

Datum proizvodnje in št. šarže sta odtisnjena na embalaži.

Neto teža: 200g, 2kg

Proizvajalec: Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 2, D-72525 Münsingen, Nemčija

Distributer: METROB d.o.o., Začret 20a, SI-3202 Ljubecna, T.: 03 7806 330, www.metrob.si

Če tretiranje ni učinkovito, obvestite imetnika registracije.

UFI-coda: M300-P0FG-K00E-G91C