

Copstar®

SISTEMIČNO BAKROVO LISTNO GNOJILO ZA LISTNO ALI TALNO GNOJENJE

Proizvod vsebuje:

6,0% w/w (7,5% w/w) Cu skupni in vodotopni baker

Copstar je korektor pomanjkanja bakra. Uporaba bakra omogoča povečanje odpornosti rastlin na nekatere glivične bolezni. Ima pomembno vlogo pri delovanju presnovnih poti, ki omogočajo vzpostavljanje samoobrambe rastlin.

Odmerki in način uporabe:

- **Bučevke in razhudnikovke** (paradižnik, paprika, feferoni, jajčevci, krompir): Od 15 dneva po presajanju. Foliarno: 10ml/10l vode na začetku rasti in kasneje 10-20 ml/10l vode. Pri vnosu v tla, s fertigacijo, v odmerku 10-30ml/10m² na aplikacijo.
- **Listna zelenjava**: Od 15 dne po presajanju. Listno: 10ml/10l vode na začetku rasti in kasneje 10-20 ml/10l vode. Pri vnosu v tla, s fertigacijo, v odmerku 10-30ml/10m² na aplikacijo.
- **Sadno drevje, vinska trta**: Foliarno: 20-25 ml/10 l vode. S fertigacijo odmerek 20-30 ml/10m² na aplikacijo.
- **Oljke**: foliarno 20-40 ml/10l vode, d fertigacijo: 20-30 ml/10m² na aplikacijo.

Opozorila:

Ne nanašajte na kulture, občutljive na baker. Med dvema aplikacijama naj mine najmanj 15 dni. Izogibajte se foliarni aplikaciji na občutljivih posevkih, v tem primeru ima prednost aplikacija v tla. Pri foliarnem škropljenju vedno nanašajte samostojno. Ne uporabljajte na rastlinah pod stresom (suša, prekomerna omočenost tal, mraz ali vročina). Ne nanašajte v času zelo visokih ali zelo nizkih temperatur in v pogojih visoke relativne vlažnosti. Pri rastlinah, ki še niso ukoreninjene ali imajo slabo razvite korenine, se izogibajte uporabi z namakanjem. Ne mešajte s proizvodi z zelo alkalnim pH. Ne mešajte s proizvodi, ki vsebujejo kalcij; ne mešajte z žveplom, olji in sulfokalcini. Mešanje z drugimi proizvodi, ki vsebujejo baker in aminokisljine je možno v nekaterih kulturah, kot so oljke. Ne dodajajte močil in ne mešajte s proizvodi, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi v svoji formulaciji. Hraniti pri temperaturi med 0°C in 50°C. Uporabite v primeru ugotovljene potrebe. Ne prekoračite priporočenih odmerkov.

Varnostne in okoljske informacije:

Povzročata hude opekline kože in poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti zunaj dosega otrok. Po uporabi temeljito umiti roke. Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Odstraniti vsebino/posodo po sistemu **ločnega zbiranja** odpadkov

omogočenem v vaši občini. Standardni stavki za fitofarmacevtska sredstva. S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode.

V kolikor se ne upoštevajo navodila za uporabi po priloženi etiketi, uporabnik odgovarja sam za morebitno nastalo škodo (neučinkovitost, toksičnost,...).

Odstranjevanje: Prazne embalaže ne uporabljajte za druge namene! Prazno embalažo oddajte pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu odpadkov v skladu z veljavno okoljsko zakonodajo.

Rok uporabe: Ob pravilnem skladiščenju in zaprti embalaži je rok uporabe 3 leta od datuma proizvodnje.

Datum proizvodnje in številka šarže: Odtisnjeno na embalaži.

Proizvod dovoljen za uporabo v **ekološki pridelavi** skladno Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta 2018/848 in Uredbi Komisije 2021/1165 ter Uredbi NOP in JAS. ECOCERT F – 32600. CAAE.



NEVARNO

Proizvajalec: Dymsa, Camino de Enmedio, 120 50013 Zaragoza (Spain) +34 976 461 516 www.daymsa.com
mail@daymsa.com

Distributer: METROB d.o.o., Začret 20 a, SI-3202 Ljubecna, T.: 03 7806 330, E: info@metrob.si
www.metrob.eu

Vsebina: **50 ml**

®zaščitena blagovna znamka