

Izdelek:	WETCIT NEO™
Koda izdelka:	368-P-1-B (368-P-1-A)
Opredelitev izdelka:	močilo
Vrsta formulacije:	ME
AI / %:	alkohol etoksilat 8,15 % m/m
Predpisani opis proizvoda:	Močilo za izboljšanje nanosa in razporeditve škroplilnih brozg v kmetijstvu in hortikulturi

Splošne informacije:

Ključne besede:

Površinsko aktivna snov

Močilo

Sredstvo za izboljšanje površinske porazdelitve

Sredstvo za penetracijo

WETCIT NEO se uporablja kot dodatek škroplilnim brozgam, ki vsebujejo fitofarmacevtska sredstva, listna gnojila, ali druga dovoljena sredstva za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu in na tratah.

Redna uporaba WETCIT NEO preprečuje tvorbo in kopičenje ostankov v škroplilnih napravah in mašenje šob.

Način delovanja:

WETCIT NEO je površinsko aktivna snov, ki občutno zmanjšuje površinsko napetost vode in pri nanosu proizvaja enakomerne kapljice mešanice.

WETCIT NEO izboljšuje vlaženje in razporeditev škroplilnih brozg ter doseganje težje dostopnih rastlinskih delov – zlasti na vodo odbojnih rastlinskih površinah in posevkih z gostim listjem.

WETCIT NEO izboljša udarni učinek fitofarmacevtskih sredstev z izboljšanjem stika z voskastimi povrhnjicami žuželk in zunanjimi hidrofobnimi strukturami gliv.

WETCIT NEO ne zmanjšuje fotosinteze ali transpiracije, pogosto povezane z uporabo mineralnih in tradicionalnih rastlinskih olj.

Učinkovitost WETCIT NEO je neodvisna od reakcije (pH) škroplilne brozge, dodatek WETCIT NEO pa ne povzroča sprememb reakcije (pH) škroplilnih brozg.

WETCIT NEO do 6 dni po nanosu vpliva na prerazporeditev vode na površini listov in s tem zmanjšuje tvorbo kapljic ter omogoča prerazporeditev škroplilne brozge po listih (ponovno vlaženje).

Uporaba:

Močilo za izboljšanje nanosa in razporeditve škroplilnih brozg v kmetijstvu in hortikulturi. Na vseh vrstah rastlin. Foliarna uporaba.

vrsta rastlin	mešanje	največje število škropljenj in zadnja uporaba	škroplilna oprema
vse vrste rastlin	z vsemi, v kmetijstvu dovoljenimi sredstvi in listnimi gnojili	upoštevac omejitve partnerja za mešanje	brez omejitev uporabe razpoložljivih tehnik za nanašanje (škroplilniki in pršilniki ne glede na količino uporabljene vode)

Pri škropljenju vlažnih rastlin za preprečenje razredčenja začetni odmerki zvišajte za 0,05 %.

Mešanje: Mešanje WETCIT NEO podlega postopku mešanja, predvidenemu za partnersko sredstvo. WETCIT NEO se škropilnim brozgam dodaja nazadnje, potem ko je rezervoar škropilnega agregata napolnjen do najmanj dveh tretjin končne prostornine. Za najboljše rezultate uporabite v 24 urah po mešanju.

Zaradi raztapljanja netopnih oborin in ostankov v škropilnih agregatih te pred prvo uporabo WETCIT NEO temeljito očistite in med uporabo pogosteje preverite filtre!

Odmerek:

vrsta rastlin	vrsta proizvoda	namen	Koncentracija WETCIT NEO v končnem volumnu škropilne brozge (v/v)
vse vrste rastlin	insekticidi, fungicidi, akaricidi, herbicidi, defolijanti, regulatorji rasti, foliarna gnojila, biostimulanti	porazdelitev, omočenje	0,05 – 0,15%
		porazdelitev omočenje, + proti odtekanju, + ponovno vlaženje, + premeščanje	>0,15 - <0,25%
		porazdelitev omočenje, + proti odtekanju, + ponovno vlaženje, + premeščanje, + penetracija	0,25 – 0,30%

Kompatibilnost:

WETCIT NEO je združljiv z večino sredstev, ki se uporabljajo v kmetijski namene. Kljub temu lahko na združljivost vplivajo drugi proizvodi v mešanici v rezervoarju, zato je treba s končno mešanico pred škropljenjem po predvidenih posevkih opraviti predhodni test v majhnem obsegu.

Fitotoksičnost:

Nanos opravite jutraj ali zvečer (izogibajte se visokim temperaturam).

Ne škropite do točke odtekanja, zlasti v fazah zavezanja plodičev pečkatega sadja, češenj, namiznega grozdja ali drugih občutljivih poljščin.

Zaradi razlik v formulacijah bakrenih in žveplovih sredstev je test združljivosti zelo priporočljiv!

Na rastlinah in v razvojnih fazah, občutljivih na baker, je potrebna previdnost.

Pri mešanju s proizvodi, za katere je znano, da povzročajo škodo na pridelku, je za zmanjšanje tveganja fitotoksičnosti največji dopusten odmerek WETCIT NEO 0,25 %!

Pri mešanju več različnih sredstev je količino WETCIT NEO priporočljivo zmanjšati na spodnji odmerek (0,05 – 0,15 %).

Pri uporabi upoštevajte navodila na etiketi partnerskega sredstva.

Razvrstitev strupenosti:

Razvrstitev po GHS (1272/2008/ES, CLP)

GHS/CLP

..... **DSMS**

Datum poteka roka uporabe: 2 leti od dneva proizvodnje. Številka šarže in datum proizvodnje se nahajata na embalaži.

Ukrepi za prvo pomoč:

Splošne opombe

Prizadete osebe ne pustite brez nadzora. Odstranite žrtev iz nevarnega območja. Prizadeto osebo naj bo topla, mirna in pokrita. Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. V vseh dvomljivih primerih ali če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč. V primeru nezavesti postavite osebo v ležeči položaj. Nikoli ne dajajte ničesar peroralno.

Po vdihavanju

V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom. Zagotovite svež zrak.

Po stiku s kožo

Umiti z veliko mila in vode.

Po stiku z očmi

Odstranite kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem. Obilno izpirajte s čisto, svežo vodo vsaj 10 minut, pri tem pa držite veke narazen.

Po zaužitju

Usta izpirati z vodo (samo če je oseba pri zavesti). NE izzvati bruhanja.

Shranjevanje

Hraniti v originalni embalaži, dobro zaprto, na suhem, hladnem in dobro prezračenem mestu, zaščiteno pred sončno svetlobo, vročino in vlago. Hraniti pri sobni temperaturi, zaščiteno pred zmrzaljo.