



COMPO Dolgotrajno gnojilo za rododendrone

PFC 1 (C)(I)(a)(ii) - Sestavljeno trdno anorgansko gnojilo z makrohranili NPK (+MgO+SO₃) 16-4-13 (+4,5+27,5)

Sestava:

16 %	N	skupni dušik 3,6% dušik v obliki amonijevega dušika 5% dušik v obliki sečninskega dušika 7% formaldehid sečnina dušik
4 %	P ₂ O ₅	skupni fosforjev pentoksid 3,7% vodotopni fosforjev pentoksid 4% nevtralni fosforjev pentoksi, topen v amonijevem citratu
13 %	MgO	vodotipni magnezijev oksid
27,5%	SO ₃	skupni žveplov trioksid 26,5% vodotopni žveplov trioksid

Vsebuje še: baker (Cu) 0,06%, železo (Fe) 0,4%, mangan (Mn) 0,06%, Cink (Zn) 0,06%.

Nizka vsebnost kloridov.

Granulometrija: granule, prehodnost sita 90% pri 5 mm

Sestavine: Kalijev sulfat¹ (CAS št. 7778-80-5), metilen urea⁸ (CAS št. 598-50-5), amonijev sulfat sečnina¹ (CAS št. 57-13-6, 7783-20-2), magnezijev sulfat¹ (CAS št. 14168-73-1), amonijev fosfat¹ (CAS št. 7783-28-0). ¹CMC ¹ Snovi in zmesi nepredelanih surovin, ⁸CMC ⁸ hranilo Polimeri

Opis:

- Eno gnojenje na leto
- Viden takojšen učinek, ki traja do 4 mesece
- Dostopnost hranil glede na potrebe do 4 mesece
- Izogibanje prekomernemu in premajhnemu gnojenju
- Zmanjšanje izpiranja nitratov
- Večja odpornost na sušo- varčuje z vodo

COMPO dolgotrajno gnojilo za rododendrone je zasnovano posebej za potrebe kisljubenih rastlin, kot so rododendroni, hortenzije, azaleje in vresje ter jagodičevje, kot so borovnice in brusnice. Gnojilo optimalno prehrani vaše rastline v celi sezoni s samo enkratnim gnojenjem. To inovativno gnojilo omogoča kontrolirano in enakomerno sproščanje hranil do 4 mesece.

1. Takojšnji učinek: neoplaščen del gnojila sprosti svoja hranila takoj, s čimer je rastlina prehranjena od prvega dneva po gnojenju dalje.

2. Dolgotrajni učinek: Preostale granule so oplaščene s posebno opno, ki kontrolira sproščanje hranil v naslednjih 4 mesecih.

Navodila za uporabo in odmerki:

Gnojilo raztrosimo in z orodjem plitko vkopljemo v prst, ali pa napolnimo v izvrtine, na obodu koreninskega spleta. Izvrtine pokrijemo s prstjo. Gnojilo je učinkovito samo v stiku s prstjo. Zrna z listov in iglic otresemo.

Priporočila za odmerjanje: 1 zvrhana jedilna žlica je približno 25 g, 1 L pa približno 1 kg gnojila.

Rododendroni (nove zasaditve – spomladi)	70 g/m ²	
Rododendroni (nove zasaditve – jeseni)	Gnojimo samo pred cvetenjem naslednje leto	
Rododendroni (obstoječi nasadi)	100 g/m ² pred cvetenjem	
Hortenzije, Azeleje	70g/m ² pred cvetenjem	
Resje	20g/m ³ pred cvetenjem	
Borovnice	40g/m ³ april/maj	
Brusnice	20g/m ³ april/maj	

Vsebina: 2 kg (za cca 40m²)

Opozorilo:

Ne prekoračite predpisanega odmerka. Preprečite, da gnojilo pride v odpadno vodo ali druge vodne površine. Raztreseno gnojilo takoj odstranite iz teras ter lesenih ali kamnitih tal. To gnojilo vsebuje sečnino, sproščanje in kopičenje amoniaka lahko vpliva na kakovost zraka. Glede na lokalne razmere sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe.

Navodila za shranjevanje:

Hranite v originalni embalaži v temnem in suhem prostoru izven dosega otrok in živali. Načeto embalažo hranite tesno zaprto. Pri pravilnem skladiščenju je rok uporabe neomejen.

Proizvajalec: COMPO GmbH, Gildenstraße 38, 48157 Münster, Nemčija

Prodajalec: Metrob d.o.o., Začret 20 a, SI-3202 Ljubecna, Slovenija. www.metrob.si, info@metrob.si