

nematop® Rilčkar-Stop

Biotično sredstvo za zatiranje odraslih osebkov **brazdastega trsnega rilčkarja** (*Otiiorhynchus sulcatus*) (Coleoptera, Curculionidae) na okrasnih rastlinah in jagodičevju na prostem.

Entomopatogene ogorčice se nahajajo v 20 g gela, vtisnjenega v zareze lovilne plošče. Plošče položite z utori navzdol pod napadene rastline, na terasah in balkonih tudi na površino substrata večjih posod za rastline v času prisotnosti škodljivih organizmov na rastlinah in sicer, ko je temperatura zraka od 12 do 28°C . Priporočen odmerek: 1 past zadošča za tretiranje 10 m² površine.

Vsebuje:

entomopatogene ogorčice *Steinernema carpocapsae* (Steinernematidae) v infektivni razvojni fazi (I/II) – 90%
neaktivno nosilo z vodo - 10%.

Lovilna plošča

Proizvajalca: E-NEMA GMBH, KLAUSDORFER STRAÙE 28-36, 24223 SCHWENTINENTAL, Nemčija
www.e-nema.de

Zastopa in prodaja: METROB d.o.o., Začret 20a, SI-3202 Ljubečna, T.: 03 7806 330, F.: 03 7806 341, www.metrob.eu

Vsebina: 2,5 mio entomopatogenih ogorčic (EPO) v infektivni razvojni fazi

1 lovilna plošča zadošča za tretiranje 10 m² površine ali 5 tekočih metrov žive meje.

Skladiščenje:

Po prejemu odstranimo transportno embalažo in do uporabe hranimo v originalno zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu (spodnji prekat hladilnika) pri temperaturi +5°C. Uporabimo do datuma, navedenega na embalaži. Načeto embalažo porabimo takoj in vsebine ne delimo na več časovno ločenih obrokov.

Dovoljenje za trženje:

Številka dovoljenja in organ, ki ga je izdal: št. U3430-32/2015/3, dne 18.06.2015, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Rok uporabe: 6 tednov od prejema pri upoštevanju pogojev skladiščenja.

Pred uporabo natančno preberite Navodila za ravnanje pri transportu, hranjenju, uporabi ter navodila z varnostnimi ukrepi.

Zavoječ vsebuje žive organizme (entomopatogene ogorčice).

Hrani na hladnem, ne zamrzuj.

Uporabi do roka uporabe.

Navodila za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi ter navodila z varnostnimi ukrepi

Sredstvo **nematop® Rilčkar-Stop** se uporablja za biotično varstvo rastlin za zatiranje ličink škodljivega organizma. Vsebuje entomopatogene ogorčice vrste *Heterohabditis bacteriophora*

(Heterorhabditidae), ki so varne za uporabnike, potrošnike in okolje. Za uporabo sredstva **nematop® Rilčkar-Stop** ni nobenih omejitev ali dodatnih varnostnih navodil. Preprosta namestitvev lovilnih plošč z utori navzdol pod napadene rastline.

Način delovanja - nematop® Rilčkar - Stop: ogorčice po vnosu v tla aktivno iščejo insekte (1), prodro vanj in sprostijo simbiotsko bakterijo (2), v mrtvem insektu se razmnožujejo (3), nova generacija insekta zapusti (4) in išče nove insekte v okolici (1).

Čas in pogoji uporabe: Od aprila do septembra na prostem pri temperaturi zraka, višji od 14°C. Zelo suha tla pred namestitvijo plošč zaliti. **Ne aplicirati v sončnem vremenu. Ogorčice so občutljive na UV žarčenje in sušo. Uporabiti zvečer, v oblačnem vremenu ali med dežjem. Temperatura zraka naj bo vsaj nekaj ur dnevno višja od 12°C. Lovilno ploščo vzdrževati vlažno (zadošča dež ali običajno zalivanje rastlin).**

Nameščanje lovilne plošče: nematop® Rilčkar-Stop položite z utori navzdol pod napadene rastline. Premeščanje plošč v času uporabe je mogoče, ni pa potrebno. Zelo suha tla pred namestitvijo plošč zaliti. Lovilno ploščo vzdrževati vlažno (zadošča dež ali običajno zalivanje rastlin).

Način uporabe in odmerek

Lovilne plošče položiti z utori navzdol pod napadene rastline. Na terasah in balkonih tudi na površino substrata večjih posod za rastline. Premeščanje plošč v času uporabe je mogoče, ni pa potrebno.

Zelo suha tla pred namestitvijo plošč zaliti. Ploščo vzdrževati vlažno (zadošča dež ali običajno zalivanje rastlin).

1 past zadošča za površino približno 10 m² ali 5 tekočih metrov žive meje.

Ogorčice so aktivne 6 tednov po namestitvi plošče. Pri močnem napadu plošče po 6 tednih nadomestiti z novimi.

Navodilo za ravnanje pri transportu, hranjenju in uporabi

Pri transportu morate biti pozorni, da pripravek ni izpostavljen vročini oziroma, da se premešča v hladnih razmerah, saj vsebuje žive koristne organizme. Po prejemu odstranite transportno embalažo in do uporabe hranite v originalno zaprti embalaži na suhem in hladnem mestu (spodnji prekat hladilnika) pri temperaturi 4 - 12°C. Ne zamrzujte in ne izpostavljate temp. preko 35°C. Po prejemu organizme aplicirajte kakor hitro mogoče. Uporabite do datuma, navedenega na embalaži. Načeto embalažo porabite takoj in vsebine ne delite na več časovno ločenih nanosov.

Odstranjevanje ostankov sredstva in prazne embalaže: izdelek in embalažo odstranjujte po lokalnih določilih kot komunalen odpadek.