

simpro

SKUPINA 28 | 27 FUNGICID

Kombiniran kontaktni in sistemski fungicid v obliki koncentrirane suspenzije (SC)



Vsebina:

5L

Vsebuje:

propamokarb hidroklorid - 400 g/L (37,6 % w/w); CAS št.: 25606-41-1;
cimoksanil - 50 g/L (4,7 % w/w); CAS št.: 57966-95-7



POZOR

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo.

Preprečiti vdihavanje razpršila. Nositi zaščitne rokavice, zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode in mila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Prestreči razlito tekočino. Hraniti zaklenjeno. Odstraniti vsebino/pododo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtoknih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtoknih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretiran varovalni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

Imetnik registracije/Proizvajalec: Sharda Cropchem Limited, Prime Business Park, Dashrathlaj Joshi Road, Vile Parle (West), 400056, Mumbai, Indija, ki ga v Evropski uniji zastopa Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas, Business Center, Carril Condomina no 3, 12th Floor, 30006 Murcia, Španija

Distributer v RS: Metrob d.o.o., Začet 20a, 3202 Ljubecna, T: +386 3 78 06 330, info@metrob.si, www.metrob.si

Skladiščenje: Sredstvo shranjujemo v originalni in dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru, zaščitenim pred vlago, pri temperaturi 0 - 30 °C ter zaščiten pred virom toplote, ločeno od hrane, pijače in krmlil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Osnovna odločba o registraciji št. U34330-57/2024-2337-28 z dne 26. 3. 2026 Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z vsemi spremembami.

Datum proizvodnje, kontrolna številka formulacije in datum poteka roka uporabe so natisnjeni na embalaži.

Rok uporabe: 2 leti od datuma proizvodnje

Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno!

V primeru zastrupitve takoj prenehajte z delom, pokličite zdravnika in ponesrečencu nudite prvo pomoč, kot je navedeno v priloženem navodilu za uporabo.

Navodilo za uporabo je v skladu z odločbo o registraciji.

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!

SREDSTVO SE SME PRODAJATI SAMO OB PREDLOŽITVI POTRDILA O PRIDOBITVI ZNANJ IZ FITOMEDICINE.



Sharda Cropchem



UFI: AAC3-KXQK-UP07-FHN9

NAČIN DELOVANJA: Sredstvo SIMPRO v obliki koncentrirane suspenzije vsebuje aktivni snovi *cimoksanil* in *propamokarb hidroklorid*. Aktivna snov *cimoksanil* deluje lokalno sistemsko in v rastlino hitro prodre. Aktivna snov *propamokarb hidroklorid* deluje sistemsko in se v rastlino absorbira preko korenin in listov.

NAVODILO ZA UPORABO: Sredstvo SIMPRO se uporablja v **krompirju** za zmanjševanje okužb **krompirjeve plesni** (*Phytophthora infestans*) v odmerku 2,5 L/ha (25 mL na 100 m²), pri priporočenih porabi vode 200-600 L/ha. Trebitra se preventivno v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin, v času od razvojne faze, ko je viden prvi bazalni stranski poganjek (> 5 cm) do faze, ko je 50 % listov rjavkastih (BBCH 21-95). OPOZORILO: Š fitofarmacevtskim sredstvom SIMPRO ali drugim FFS, ki vsebujejo aktivno snov propamokarb, se lahko na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni dobi. Časovni interval med posameznimi tretiranjimi naj bo 7-10 dni.

Uporaba ročne/optrne škroplilnice ni predvidena.

KARENCA: Karenca za krompir je 14 dni.

FITOTOKSICNOST: Sredstvo ni fitotoksično za gojene rastline, na katerih je dovoljena uporaba, če se ga uporablja v skladu z navodili za uporabo.

ANTIREZISTENSTNA STRATEGIJA: Sredstvo SIMPRO vsebuje aktivni snovi *cimoksanil* in *propamokarb hidroklorid*. *Cimoksanil*, iz skupine cianoacetamid oksimov, je glede na način delovanja po FRAC klasifikaciji uvrščen v skupino 27, *propamokarb hidroklorid*, iz skupine karbamatov, v FRAC skupino 28. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na obe aktivni snovi je majhno do srednje. Dodatne informacije so na voljo na www.frac.info. Pri večletni uporabi fungicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni organizmi preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojavnosti rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba sredstev z različnimi načini delovanja.

MEŠANJE: O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

PRIPIRAVA ŠKROPLILNE BROZGE: Zagotoviti je potrebno, da je škroplilnica čista in nastavljena tako, da omogoča pravi volumen in enakomeren nanos škropliva. Rezervoar škroplilnice napolnite do polovice predvidene količine z vodo, dodajte odmerjeno količino sredstva SIMPRO. Dodajte preostalo količino vode in dobro premešajte. Škroplilno brozgo porabite še isti dan, ko ste jo pripravili.

VAROVANJE OKOLJA: Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov toda, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba pri tretiranju upoštevati netretirane varovalni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

ZNAKI ZASTRUPITVE: Pri stiku s kožo lahko povzroči alergijski odziv kože.

PRVA POMOČ IN MEDICINSKI UKREPI OB NEZGODI:

Splošni ukrepi: Prizadeto osebo se umakne iz kontaminiranega območja na svež zrak oz. v dobro zrachen prostor, se jo zavaruje pred mrazom oziroma vročino ter se ji zagotovi osnovne življenjske funkcije in poišče zdravniško pomoč.

Pri vdihavanju: Ravnati se je treba v skladu s splošnimi ukrepi.

Stik s kožo: Takoj se odstrani se kontaminirano obleko, kožo pa temeljito umije z vodo in milom. Če draženje ne preneha, se je treba posvetovati z zdravnikom. Pred ponovno uporabo je treba delovno obleko oprati.

Stik z očmi: S palcem in kazalcem se razpre vekci prizadetega očesa in oko temeljito spera s počasnim curkom s čisto mlačno vodo. Če draženje oči ne mine, se je treba posvetovati z zdravnikom ali okulistom.

Pri zaužitju: Usta se temeljito spera z vodo, prizadeti naj popije do 2 dl vode. Bruhanja se ne izziva. Osebi z moteno zavestjo se ne sme dati ničesar piti, niti se ji ne sme izzvati bruhanja. Takoj se pokliče zdravnik in se mu pokaže originalno embalažo in/ali navodilo za uporabo sredstva.

Medicinska pomoč: Zagotoviti in vzdrževati je treba osnovne življenjske funkcije. **Zelodca se ne izpira, razen če tako svetuje Center za zastrupitve** (Center za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Živalsko ogled in salinico odvajalo se daje le, če tako svetuje Center za zastrupitve (Center za

klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ). Zdravljenje je simptomatično in podporno. O specifičnem protistupu se je treba posvetovati s Centrom za zastrupitve (Centrom za klinično toksikologijo in farmakologijo, UKC LJ).

VARSTVO PRI DELU: Pri rokovanju s koncentriranim sredstvom, mešanju škroplilne brozge, polnjenju in čiščenju rezervoarja mora delavec uporabljati primerno zaščitno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje in ščitnik za obraz ali tesno prilagajajoča zaščitna očala.

Pri tretiranju s traktorsko nošeno/vlečeno škroplilnico mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in trpežno obutev ali gumijaste škornje.

Pri stiku s tretiranimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi, nogavice) in zaprte čevlje.

DELOVNA KARENCA: Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škroplilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

NAVODILO ZA RAVNANJE V PRIMERU NENAMERNEGA IZPUSTA: Obvezna je uporaba zaščitne delovne obleke in obutve, po potrebi tudi zaščitne maske in dihalnega aparata. Nezaščitenim osebam je gibanje po področju izpusta prepovedano. Preprečimo širjenje sredstva v okolje, še posebej v vode. Razlito sredstvo in poškodovano embalažo zberemo in oddamo pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.

V zaprtem prostoru: Pri razlitju je potrebno po razlitem sredstvu posuti vpojni material (pesek, diatomejska zemlja, žaganje, univerzalno vezivo). Poškodovano embalažo in vpiito sredstvo je potrebno zbrati v ustrezne večje in posebej označene posode s pokrovom. Večje količine odpadne vode zberemo v posode, da preprečimo onesnaževanje odvodnih kanalov, stoječih in tekočih voda.

V primeru nesreče pri prevozu: Zavarujemo kraj dogodka in opozorimo druge udeležence v prometu, najbližjo postajo policije oziroma gasilce ali Center za obveščanje na telefonsko številko 112. Preprečimo onesnaženje voda, pri tem ukrepamo kot v primeru nesreče v zaprtem prostoru. O razlitju sredstva ali razlitju večje količine škroplilne brozge je potrebno obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112.

V primeru požara: Gasimo s CO₂, prahom, peno ali vodno meglo. Pri gašenju se izogibati uporabi vodnega črka. V primeru požara uporabljajte dihalni aparat in primerno zaščitno obleko, ker se pri gorenju lahko sproščajo toksični in dražilni hlapi.

RAVNANJE Z OSTANKI SREDSTVA IN PRAZNO EMBALAŽO: Uporabnik odda prazno embalažo, ostanke neporabljene sredstva ali sredstva, ki mu je pretekel rok uporabnosti, pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov v skladu z zakonodajo, ki ureja področje ravnanja z nevarnimi odpadki in o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Popolnoma izpraznjeno in trikrat izprano embalažo se sme odstraniti kot nevarnen odpadke skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Tekočino od izpiranja se izlije v škroplilno brozgo, tako očiščeno embalažo pa se prepusti pooblaščenemu zbiralcu odpadne embalaže oziroma se je odnese na zbirališče odpadne embalaže. Z neizpraznjeno in slabo očiščeno embalažo se ravna kot z nevarnim odpadkom. Prazne embalaže se ne sme ponovno uporabiti!

Opozorilo: SIMPRO se lahko uporablja le v skladu z navodilom na etiketi. Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje, do česar bi lahko prišlo zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja, proizvajalec ne odgovarja. Morebitna škoda ali slabše delovanje je lahko tudi posledica raznih lokalnih dejavnikov, kot so tip tal, sorte in vremenski pogoji, za katere proizvajalec prav tako ne more jamčiti.